

พิจารณาออกจากบัญชียาโรงพยาบาล 3 รายการ เป็น ED 2 รายการ NED 1 รายการ  
ไม่พิจารณาเข้าจำนวน 6 รายการ  
รอพิจารณา 8 รายการ

ตารางที่ 3 สรุปรายการยาเข้า-ออก บัญชียาโรงพยาบาล ภายหลังการพิจารณา

สรุปรายการยาเข้า	สรุปรายการยาออก
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amoxicillin syrup 250 mg/5mL ED (ก)</li> <li>2. Pimecrolimus 1% cream NED</li> <li>3. Influenza Vaccine (4 สายพันธุ์) NED</li> <li>4. Cardioplegia – St.Thomas NED</li> <li>5. Bicalutamide tablet 50 mg ED (ง)</li> <li>6. Micafungin injection 50 mg ED (จ2)</li> <li>7. Liposomal Amphotericin B injection 50 mg ED (จ2)</li> <li>8. Papavarine injection 60 mg/2 mL NED</li> <li>9. Alfuzosin HCl SR Tablet 10 mg ED (ง)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formalin solution</li> <li>2. Amoxicillin Syrup 125mg/5ml ED (ก)</li> <li>3. Flutamide tablet 250 mg NED</li> </ol>

ตารางที่ 4 สรุปบัญชียาภายหลังการพิจารณา

ปี	รายการยาทั้งหมด	ED	NED
ปี 2560	766	590 (77.02%)	176 (22.98%)
ปี 2561	794	614 (77.32%)	180 (22.68%)
ปี 2562	812	624 (76.75%)	188 (23.25%)
ปี 2563	821	630 (76.73%)	191 (23.27%)
ปี 2564	833	642 (77.07%)	191 (22.93%)
ปี 2565	846	650 (77.78%)	196 (22.22%)
ปี 2566	854	657 (76.93%)	197 (23.07%)
ปี 2567	860	660 (76.74%)	200 (23.26%)

### 3.3 บททวนเกณฑ์และสิทธิ์การสั่งใช้ Dulaglutide

ที่มา : เดิมยา Dulaglutide ถูกเสนอเข้าใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ซึ่งมีประโยชน์ด้านการลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดน้ำหนัก ซึ่งการเสื่อมของไต แต่ยังไม่ได้รับการ Approve ข้อบ่งใช้ลดน้ำหนัก มีเกณฑ์การใช้ยาดังนี้

V. Dulaglutide injection 1.5 mg (Trulicity®) \*\*\*NED\*\*\*

เกณฑ์การใช้ยา (ผู้ป่วยที่ admit และยังไม่ถึงวันดับรับยาจะต้องนำยาเดิมมาใช้ขณะนอนราห)

- 1) ในผู้ป่วยที่มี high risk coronary heart disease หรือผู้ป่วยที่เป็น coronary heart disease เดิม ร่วมกับมี  $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$  หรือ  $BW \geq 90 \text{ kg}$
- 2) ใช้ยาที่รับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกได้และชำระเงินเองเท่านั้น (ไม่ใช้ทุกกรณี)  
สิทธิ์การสั่งใช้ยา เดพาอาชูรแพทบีโรคต่อมไร้ท่อ อาชูรแพทบีโรคหัวใจ

ลงชื่อแพทย์.....

ข้อมูลการสั่งใช้ยา Dulaglutide ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
พนักงานได้รับยา 10 ราย เป็นสิทธิ์เบิกได้ทั้งหมด ผู้ป่วย 2 ราย ไม่ตรงเกณฑ์การสั่งใช้ยา  
เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ป่วยเบาหวาน มีผู้ป่วย 1 ราย น้ำหนัก หรือ BMI ไม่ตรงตามเกณฑ์

นพ.ธงชัย ให้ข้อมูล ผู้ป่วยน้ำหนัก หรือ BMI ไม่ตรงตามเกณฑ์ และไม่ได้เป็นเบาหวาน  
แต่จำเป็นต้องใช้ยา Dulaglutide เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย Obstructive Sleep Apnea: OSA  
จากสถานพยาบาลอื่น และน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วยได้  
จึงขอเพิ่มเกณฑ์การสั่งใช้ยา Dulaglutide กรณีได้รับการวินิจฉัยและสั่งยามาจากสถานพยาบาลอื่น  
แพทย์มีความเห็นสมควรจำเป็นต้องได้รับยาต่อ โดยให้ระบุเหตุผลดังกล่าว

อายุรแพทย์และอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ขอเพิ่มสิทธิ์การสั่งใช้ยา Dulaglutide

หรือใช้ในคลินิกอายุรกรรม SMC

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ: อนุมัติปรับเกณฑ์การใช้ยา เพิ่มสิทธิ์การสั่งใช้ยาให้อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ

จากข้อมูลประโยชน์ด้านการชะลอการเสื่อมของไต ดังนี้

Dulaglutide injection 1.5 mg (Trulicity®) \*\*\*NED\*\*\*

เกณฑ์การใช้ยา (ผู้ป่วยที่ admit และยังไม่ถึงวันดับรับยาจะต้องนำยาเดิมมาใช้ขณะนอนราห)

- 1) ในผู้ป่วย T2DM ที่มี high risk coronary heart disease หรือผู้ป่วยที่เป็น coronary heart disease เดิม ร่วมกับมี  $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$  หรือ  $BW \geq 90 \text{ kg}$
- 2) มีความจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องจากสถานพยาบาลอื่น โปรดระบุ

\*\*ใช้ยาที่รับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกได้ และชำระเงินเองเท่านั้น (ไม่ใช้ทุกกรณี)

สิทธิ์การสั่งใช้ยา เดพาอาชูรแพทบีโรคต่อมไร้ท่อ อาชูรแพทบีโรคหัวใจ และอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ

 มติที่ประชุม PTC: เห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ ปรับเกณฑ์และสิทธิ์การสั่งใช้ยา Dulaglutide

### 3.4 ขอเพิ่มสิทธิ์การสั่งยา และบัญชีรายการโรงพยาบาลคร่าฉลอม

ที่มา: นพ.สมนึก บุญธรรมจินดา อาชูรแพทบีปฏิบัติงานโรงพยาบาลคร่าฉลอม  
ขออนุมัติสิทธิ์การสั่งใช้ยา และเพิ่มบัญชียา Empagliflozin ที่โรงพยาบาลคร่าฉลอม